




EMERGENCY FIRST RESPONSE®

Creating Confidence to Care®

Participant Final Exam
Français

CPR & AED



EMERGENCY
first response®




Emergency First Response® CPR & AED Examen final


Instructions : Choisissez la meilleure réponse parmi les choix proposés, ou suivez les instructions données. **N'ÉCRIVEZ RIEN DANS CE LIVRET D'EXAMEN.**

1. Pendant votre formation Emergency First Response, vous apprenez à prodiguer des soins d'urgence en suivant les mêmes priorités que celles utilisées par les praticiens spécialisés dans ce domaine pour venir en aide aux personnes blessées ou malades.
A Vrai **B** Faux
2. Lorsque quelqu'un a besoin de soins d'urgence, pourquoi le temps est-il un facteur critique ?
A Les chances de réussite d'une réanimation diminuent rapidement avec le temps.
B Il devient impossible d'administrer les premiers secours.
C Les services d'urgences médicales sont généralement loin.
D Tout ce qui précède
3. Pourquoi les gens hésitent-ils parfois à porter secours à une personne en détresse ?
A Anxiété
B Peur d'une intervention imparfaite
C Peur de la contamination
D Toutes les réponses sont vraies.
4. En général, pour être couvert par les lois du bon samaritain, vous devez : (*Sélectionnez toutes les réponses valides.*)
A Agir de bonne foi.
B Ne jamais panser les plaies d'un patient qui fait une hémorragie.
C Agir en personne prudente.
D Ne prodiguer que des soins auxquels vous avez été formé.
5. Pourquoi faut-il prêter assistance à quelqu'un qui a besoin de soins d'urgence ?
A Votre intervention peut sauver une vie.
B Votre intervention peut accélérer le rétablissement d'un patient.
C Votre intervention peut éviter à quelqu'un une infirmité temporaire ou définitive.
D Tout ce qui précède
6. En vous référant à l'illustration de la chaîne de survie sur votre feuille de réponse, inscrivez dans les cases la lettre correspondant à chacun des maillons décrits ci-dessous :
A Reconnaissance rapide et appel à l'aide
B Soins professionnels rapides et suivi du patient
C RCP précoce
D Défibrillation précoce
7. « Appeler d'abord » signifie qu'une fois que vous avez confirmé _____, vous alertez immédiatement les services d'urgences médicales de votre région.
A qu'un patient est en état de choc
B qu'un patient est inconscient et ne respire pas normalement
C la température d'un patient
D Aucune de ces réponses

La chaîne de survie



8. Chaque fois que vous pratiquerez la RCP, le cœur du patient recommencera à battre et vous pourrez le ramener à la vie.
A Vrai **B** Faux
9. Parmi les déclarations ci-dessous, laquelle choisiriez-vous pour demander la permission d'aider un patient ?
A « Bonjour ! Je m'appelle _____, je suis secouriste. Puis-je vous aider ? ».
B Je suis médecin. Puis-je vous aider ? ».
C Vous avez mal ? Où ?
D Aucune de ces réponses.
10. Si vous pratiquez la RCP selon les techniques enseignées par cette formation, vous ne courez aucun risque d'aggraver l'état initial du patient lorsque vous l'avez trouvé.
A Vrai **B** Faux
11. En vous référant à l'illustration du Cycle de soins sur votre feuille de réponse, inscrivez dans les cases la lettre correspondant à sa signification :
A Breathing for the patient (Respirer pour le patient)
B Chest Compressions (Compressions sternales)
C Serious Bleeding (Hémorragie grave)
D Airway Open (Voies respiratoires ouvertes)



12. Quelles sont les deux signes qui permettent d'identifier un arrêt cardiaque ? (Sélectionnez deux réponses.)
A Le patient ne réagit pas quand vous lui parlez et le touchez.
B Le bras est paralysé.
C Il saigne de la bouche et du nez.
D Il ne respire pas normalement.
13. Comment faire pour alerter les services d'urgences médicales dans votre région ?
 Numéro de téléphone : _____
14. La RCP (sélectionnez toutes les réponses valides) :
A est l'abréviation de « réanimation cardio-pulmonaire ».
B est un processus en deux étapes : les compressions sternales et la respiration artificielle.
C est une procédure d'urgence intermédiaire qu'on utilise en attendant qu'un DEA soit disponible ou que les services d'urgences médicales arrivent.
D ne doit pas être utilisée pour venir en aide à un patient inconscient qui respire normalement.



15. En quoi la défibrillation est-elle importante pour un patient en arrêt cardiaque ?
- A La défibrillation interrompt un rythme cardiaque anormal et peut permettre au cœur de reprendre un battement régulier.
 - B La défibrillation provoque le battement irrégulier du cœur.
 - C Elle évite au patient d'être obligé d'aller à l'hôpital après avoir reçu la RCP.
 - D Tout ce qui précède
16. La respiration artificielle ne peut pas fournir suffisamment d'oxygène à un patient qui ne respire pas.
- A Vrai
 - B Faux



17. Comment détermine-t-on si une personne est inconsciente et ne respire pas normalement ?
- A Crier sur le patient.
 - B Prendre le pouls du patient.
 - C Taper doucement sur la clavicule du patient et vérifier s'il respire.
 - D Aucune de ces réponses.

18. La méthode d'inclinaison de la tête et traction sur le menton peut être utilisée pour ouvrir les voies respiratoires d'un patient.
- A Vrai
 - B Faux

19. Confronté à un patient inconscient et qui ne respire pas, dont les problèmes pourraient résulter d'une noyade ou d'un autre incident respiratoire, vous devez _____ et ensuite appeler les services d'urgences médicales.
- A appliquer les procédures recommandées pour l'état de choc
 - B soigner d'abord
 - C administrer la respiration artificielle d'abord
 - D le placer en position latérale de sécurité

20. Pour une RCP complète, combien faut-il pratiquer de compressions sternales par rapport aux insufflations ?
- A 10 compressions pour 1 insufflation
 - B 15 compressions pour 2 insufflations
 - C 30 compressions pour 2 insufflations
 - D 100 compressions pour 2 insufflations

21. Pour bien pratiquer la RCP, il faut administrer les compressions sternales au rythme d'au moins :
- A 200
 - B 50
 - C 100
 - D 150



- 22.** Si la respiration artificielle vous intimide ou vous met mal à l'aise pour une raison quelconque, vous pouvez :
- A** Pratiquer les compressions sternales en continu.
 - B** Ne rien faire du tout.
 - C** Appeler à l'aide.
 - D** Aucune de ces réponses
- 23.** Dans le cadre des soins d'urgence, on définit les enfants comme suit :
- A** les individus ayant passé la puberté.
 - B** les individus âgés de 1 à 12 ans (mais qui n'ont pas encore atteint la puberté).
 - C** les individus âgés de moins d'1 an.
 - D** Aucune de ces réponses
- 24.** Causes possibles d'un arrêt respiratoire :
- A** Overdose
 - B** Crise cardiaque ou arrêt cardiaque soudain
 - C** Électrocution
 - D** Toutes les réponses sont vraies.
- 25.** Si un patient en arrêt cardiaque porte un pansement ou un timbre cutané là où un des électrodes du DEA devrait être placé, vous devez :
- A** ôter le pansement ou le timbre et sécher la peau avant de placer l'électrode.
 - B** placer l'électrode à côté du timbre ou pansement.
 - C** placer l'électrode par-dessus le timbre ou pansement.
 - D** éviter d'utiliser un DEA sur ce patient.
- 26.** Le signe de détresse universel pour indiquer un étouffement consiste à :
- A** essayer de tousser.
 - B** appeler à l'aide.
 - C** se saisir le cou ou la gorge.
 - D** Toutes les réponses sont vraies.
- 27.** Un rythme cardiaque normal peut être rompu par une lésion du muscle cardiaque et devenir trop rapide et erratique.
- A** Vrai
 - B** Faux
- 28.** Qu'est-ce qu'un défibrillateur externe automatisé ?
(Sélectionnez toutes les réponses valides.)
- A** Un appareil électronique portable muni d'un ordinateur.
 - B** Un appareil qui ne devrait être utilisé que par les ambulanciers et personnels hospitaliers.
 - C** Un appareil capable d'administrer automatiquement et fidèlement un choc à un patient qui ne respire pas normalement et dont le rythme cardiaque est anormal.
 - D** Un appareil capable d'analyser les rythmes cardiaques.